

予防接種の種類	対象者（年齢）	標準的な接種間隔	接種間隔、接種回数	
ヒブ	初回 追加	生後2月から5歳に至るまでの間にある者	初回接種開始時年齢:生後2月から7月に至るまで(標準的)	
			初回	27日(医師が必要と認めるときは20日)以上(標準的には56日まで)の間隔をおいて3回。 ただし、2回目、3回目は1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は受けず、追加接種を受けること。
			追加	初回接種終了後、7か月以上(標準的には13か月まで)の間隔をおいて1回。 注1 1歳までに3回の初回接種を完了せずに1歳以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回。
			初回接種開始時年齢:生後7月に至った日の翌日から1歳に至るまで	
			初回	27日(医師が必要と認めるときは20日)以上(標準的には56日まで)の間隔をおいて2回。 ただし、2回目は1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は受けず、追加接種を受けること。
			追加	初回接種終了後、7か月以上の間隔をおいて1回。 注2 1歳までに2回の初回接種を完了せずに1歳以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回。
			初回接種開始時年齢:1歳に至った日の翌日から5歳に至るまで	
	1回			
小児用肺炎球菌	初回 追加	生後2月から5歳に至るまでの間にある者	初回接種開始時年齢:生後2月から7月に至るまで(標準的)	
			初回	2歳に至るまでの間に(標準的には生後12月まで)、27日以上の間隔をおいて3回。 ただし、初回2回目、3回目の接種は、2歳を超えた場合は受けず、追加接種を受けること。 また、初回2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は受けず、追加接種を受けること。
			追加	(標準的には生後12月から15月まで)初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳に至った日以降において1回。 (初回2回目、3回目を、2歳を超えたことにより、また初回3回目を、2回目の接種が1歳を超えたことにより行っていない場合でも、追加接種は接種可能。)
			初回接種開始時年齢:生後7月に至った日の翌日から1歳に至るまで	
			初回	2歳に至るまでの間に、(標準的には生後12月までに)27日以上の間隔をおいて2回。 ただし、初回2回目の接種は2歳を超えた場合は受けず、追加接種を受けること。
			追加	初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12か月に至った日以降において1回。 (初回2回目の接種を、2歳を超えたことにより行っていない場合でも、追加接種は接種可能。)
			初回接種開始時年齢:1歳に至った日の翌日から2歳に至るまで	
	60日以上の間隔をおいて2回			
		初回接種開始時年齢:2歳に至った日の翌日から5歳に至るまで		
	1回			