

名称		対象者	標準的な接種期間	間隔・回数
5種混合 〔対象疾患〕 ジフテリア・百日咳 破傷風・ポリオ・ヒブ	1期 初回	生後2か月から7歳6か月に 至るまでの間にある者	生後2か月から7か月に至るまで	20日以上(標準的には27から56日)の間 隔をおいて3回
	1期 追加		1期初回終了後、6か月から18か 月までの間隔をおく	1期追加は、1期初回3回目から6か 月以上の間隔をおいて1回
2種混合	2期	11歳以上13歳未満の者	11歳	1回

【1期について、5種混合ワクチンではなく、4種混合ワクチンやヒブワクチン等を組み合わせて接種する場合】

名称		対象者	標準的な接種期間	間隔・回数
(4種混合) (3種混合) (2種混合) (ポリオ)	1期 初回	生後2か月から7歳6か月に 至るまでの間にある者	生後2か月から1歳に達するまで ※2種混合を接種する場合は生後3か 月から1歳に達するまで	20日以上(標準的には20日から56日)の 間隔をおいて3回 ※2種混合を接種する場合は1期初回は2回接種。
	1期 追加	※2種混合を接種する場合は生後3か 月から7歳6か月に至るまでの間に ある者	1期初回接種終了後、12か月から18か 月までの間隔をおく	1期追加は、1期初回3回目から6か 月以上の間隔をおいて1回

名称	対象者	間隔・回数 (※接種開始時年齢によって間隔・回数異なります)
(ヒブ)	生後2か月から5歳に 至るまでの間にある者	初回接種の開始が生後2か月から7か月に至るまで
		初回接種は1歳に至るまでの間に27日(医師が認める場合は20日)以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて3回 ※1歳を超えた場合、初回2回目及び3回目は接種せず追加接種を行う。 追加接種は初回接種終了後7か月以上(標準的には7か月から13か月まで)の間隔をおいて1回。 ※初回2回目及び3回目の接種が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回1回目あるいは2回目の終了後27日(医師が認める場合は20日)以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて、追加接種を行う。
		初回接種の開始が生後7か月から1歳に至るまで
		初回接種は1歳に至るまでの間に27日(医師が認める場合は20日)以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて2回 ※1歳を超えた場合、初回2回目は接種せず、追加接種を行う。 追加接種は初回接種終了後7か月以上(標準的には7か月から13か月)の間隔をおいて1回 ※初回2回目の接種が1歳未満までに終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回1回目の終了後27日(医師が認める場合は20日)以上(標準的には27日から56日)の間隔をおいて、追加接種を行う。
	【標準的な接種期間】 初回接種開始は、生後2か 月から7か月に至るまで	初回接種の開始が1歳から5歳に至るまで
		1回